

(Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, 13: 17—20)

Ergebnisse der 2. mongolisch-tschechoslowakischen entomologisch-botanischen Expedition in der Mongolei

Nr. 14: Coleoptera — Carabidae

ARNOŠT JEDLIČKA (Praha)

- Elaphrus riparius** Linné, 1758 — Verbreitung: Europa, UdSSR, Sibirien, Turkestan, Mongolei, Japan.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Dyschirius mongolicus** Kult, 1949 — Verbreitung: Mongolei.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Bembidion morawitzi** Csiki, 1928 — Verbreitung: Japan, UdSSR, Ussuri, Wladiwostok, Mongolei, Szetschuan.
Mong. bor.: Dzun-Mod (Lok. Nr. 55) 16 Ex.
- Bembidion fasciatum** Motschulsky, 1844 — Verbreitung: Transbaikal.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 2 Ex.
- Bembidion semipunctatum** Donovan, 1806 — Verbreitung: Europa, UdSSR, Sibirien.
Mong. bor.: Songino (Lok. Nr. 58) 1 Ex.
- Bembidion baikaloussuricum** Netolitzky, 1942 — Verbreitung: UdSSR, Tschita, Nikolsk-Ussurijsk, Werchne-Udinsk.
Mong. bor.: Songino (Lok. Nr. 58) 2 Ex.
- Bembidion thermarum** Motschulsky, 1844 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal, Mongolei, Tatsienlu, Gansu, Japan.
Mong. bor.: Dzun-Mod (Lok. Nr. 55) 1 Ex.
- Bembidion obenbergeri** Lutschnik, 1928 — Verbreitung: China (Tokoto), Tien-tsin.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Bembidion thermarum mongolicum** Jedlička, 1965 — Verbreitung: Mongolei.
Mong. bor.: Songino (Lok. Nr. 58) 1 Ex.
- Bembidion popii captivorum** Netolitzky, 1942 — Verbreitung: UdSSR, Wladiwostok, Amur-Gebiet, Japan.
Mong. bor.: Songino; Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 41, 58) 2 Ex.
- Bembidion lampros** Herbst, 1784 — Verbreitung: Europa, W-Asien.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 41) 1 Ex.
- Pogonus punctulatus** Dejean, 1828 — Verbreitung: Europa, Asia min., Kaukasus, UdSSR, Sibirien, Mongolei, China.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 42) 1 Ex.
- Licinus mongolicus** Reitter, 1900 — Verbreitung: Mongolei.
Mong. mer.: Baga-Bogdo (Lok. Nr. 45) 1 Ex.
- Cymindis zargelani** Jedlička, in litt. — Verbreitung: Mongolei.
Mong. mer.: Baga-Bogdo (Lok. Nr. 45) 7 Ex.


- Cymindis binotata** Fischer—Waldheim, 1820 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal, Mongolei, Tibet.
Mong. bor.: Zaisan, Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaj-Chere; Mong. mer.: Bogd (Lok. Nr. 38, 39, 40, 49) 4 Ex.
- Cymindis binotata vittata** Fischer—Waldheim, 1820 — Verbreitung: UdSSR, Baikalgebiet.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 1 Ex.
- Cymindis binotata pallipes** Chaudoir, 1873 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal.
Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 42) 1 Ex.
- Cymindis transbaikalica** Jedlička, 1964 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal. Neu für die Mongolei.
Mong. bor.: Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 39, 42) 3 Ex.
- Daptus vittatus dorsatus** Reitter, 1900 — Verbreitung: UdSSR, Turkestan, Semiretschensk, Tibet, Asia occid.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Pardileus calceatus** Duftschmid, 1812 — Verbreitung: Europa, UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Asia centr., China, Mongolei, Japan.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 1 Ex.
- Harpalus pusillus** Motschulsky, 1850 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Turkestan, Transbaikal, Mongolei, Mandschurei.
Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 41) 1 Ex.
- Harpalus obtusus** Gebler, 1833 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Mongolei.
Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 52) 2 Ex.
- Harpalus anxius** Duftschmid, 1812 — Verbreitung: Paläarkt. Region, UdSSR, Sibirien, Baikalgebiet.
Mong. bor.: Zaisan; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 38, 42) 5 Ex.
- Harpalus tardus** Panzer, 1798 — Verbreitung: Paläarkt. Region.
Mong. mer.: Bogd, Gurban-Sajchan (Lok. Nr. 49, 50) 8 Ex.
- Harpalus serripes** Quensel, 1806? — Verbreitung: Europa, Kleinasien, UdSSR, Kaukasus, Turkestan.
Mong. bor.: Zaisan (Lok. Nr. 38) 1 Ex.
- Harpalus amplicollis** Ménétries, 1848 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Turkestan, Astrachan, Transkaukasien, Mongolei.
Mong. centr.: Arbaj-Chere; Mong. mer.: Baga-Bogdo, Bogd, Barun-Bajan-Ulan, Cogt-Ovo, Gurban-Sajchan (Lok. Nr. 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52) 68 Ex.
- Harpalus amplicollis obtusicollis** Putzeis, 1877 — Verbreitung: UdSSR, Baku, Semiretschensk, Transbaikal, Mongolei, China, Tibet.
Mong. centr.: Arbaj-Chere; Mong. mer.: Bogd (Lok. Nr. 42, 49) 2 Ex.
- Harpalus brevicornis** Germar, 1824 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal, Jenisej, Jakutsk, Ostsibirien, Mongolei.
Mong. bor.: Nucht, Zaisan, Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 37, 38, 39, 40, 42) 8 Ex.
- Harpalus lumbaris** Mannerheim, 1825 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Transbaikal, China, Tibet, Mongolei.
Mong. bor.: Zaisan; Mong. mer.: Bogd, Gurban-Sajchan; Mong. centr.: Mandalgobi (Lok. Nr. 38, 49, 50, 54) 6 Ex.
- Harpalus viridanus** Motschulsky, 1844 — Verbreitung: UdSSR, Altai, Transbaikal, Gansu, Mongolei.
Mong. bor.: Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 39, 40, 41) 3 Ex.

Harpalus fuscipalpoides Schauberger, 1926 — Verbreitung: UdSSR, Kaukasus, Mongolei.

Mong. bor.: Zaisan; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 38, 42) 2 Ex.

Harpalus (Haploharpalus) dlabolai sp. n. — Fig. 1.

Schwarz, glänzend, das erste Fühlerglied und die Palpenspitzen gelbrot, Rest der Fühler und Tarsen braunrot. Kopf mit wenig gewölbten Augen und undeutlichen Stirnfurchen. Vorderschienen am Ende deutlich nach außen lappenförmig ausgezogen. Fühler kurz, perlschnurförmig. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, fast zweimal so breit wie lang, Vorderrand leicht ausgeschnitten, Basis fast gerade, Vorderecken abgerundet, an beide Seiten gleichmäßig gerundet, Hinterecken ziemlich breit abgerundet, Seitenrandkehle vorn schmal, hinten breiter, diese entweder glatt oder fein punktiert, Basis jederseits mit einem Längsstrich oder flachem, rundlichem Grübchen, wenig punktiert, in der Mitte längsgestrichelt, Mittellinie fein. Flügeldecken etwas breiter als der Halsschild, mit abgerundeten Schultern, hinten etwas schräg abgestutzt, Streifen tief, glatt, Zwischenräume leicht gewölbt oder flach, der dritte mit einem Punkt hinter der Mitte. Mikroskulptur: Kopf und Halsschild fast glatt, Flügeldecken deutlich isodiametrisch genetzt. Länge 10—11 mm. Mong. centr.: Mandal-Gobi 2 ♀ Paratypen; Mong. mer.: Baga-Bogdo 1 ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Bogd 1 ♀ Allotypus, in der Sammlung der Entom. Abt. des Naturwiss. Museums aufbewahrt.



Unter den ostasiatischen *Haploharpalus*-Arten leicht kenntlich, denn es ist die erste Art, welche die Hinterecken deutlich abgerundet hat, denn die übrigen Arten haben die Hinterecken scharf. Von Dr. Jiří Dlabola gesammelt und zu seiner Ehre benannt.

- Poecilus gebleri** Dejean, 1828 — Verbreitung: UdSSR, Zabaikal, Transbaikal, Nikolsk, Ussurijsk, Mongolei, China, Peking, Mandschurei, Tibet, Szetschuan.
Mong. bor.: Zaisan, Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 38, 39, 40) 5 Ex.
- Poecilus fortipes** Chaudoir, 1850 — Verbreitung: UdSSR, Irkutsk, Transbaikal, Amur, Ostsibirien, Mongolei, Corea, Japan, Tibet.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 1 Ex.
- Corsyra fuscata** Fischer—Waldheim, 1822 — Verbreitung: UdSSR, Ost-Rußland, Sibirien, Transbaikal, Turkestan, Mongolei, Gansu, N-China.
Mong. centr.: Mandalgobi, Arbaj-Chere; Mong. mer.: Baga-Bogdo, Cogt-Ovo (Lok. Nr. 42, 45, 53) 44 Ex.
- Pterostichus rugosus** Gebler, 1823 — Verbreitung: UdSSR, Jenisej, Transbaikal.
Mong. bor.: Zaisan (Lok. Nr. 38) 2 Ex.
- Pterostichus rarus** Lutschnik, 1922 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal Mongolei.
Mong. centr.: Arbaj-Chere; Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 40, 41, 42, 52) 29 Ex.
- Pterostichus parens** Tschitscherin, 1897? — Verbreitung: Amur, UdSSR Neu für die Mongolei.
Mong. bor.: Zaisan (Lok. Nr. 38) 1 Ex.
- Amara fodinae** Mannerheim, 1825 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Jenisej, Amur, Ostasien, Mandschukuo.
Mong. bor.: Zaisan; Mong. mer.: Baga-Bogdo, Gurban-Sajchan (Lok. Nr. 38, 45, 46, 50) 8 Ex.
- Amara amurensis** Lutschnik, 1935 — Verbreitung: UdSSR, Amur-Gebiet.
Mong. mer.: Baga-Bogdo (Lok. Nr. 46) 1 Ex.
- Amara laevissima** Sahlberg, 1880 — Verbreitung: UdSSR, N. W-Sibirien, Jenisej, Irkutsk, Transbaikal.
Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 41) 2 Ex.
- Amara mongolica** Motschulsky, 1844? — Verbreitung: Mongolei.
Mong. centr.: Arbaj-Chere (Lok. Nr. 42) 1 Ex.
- Taphoxenus pfefferi** Jedlička, 1964 — Verbreitung: Kalgan.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Taphoxenus laticollis** Dejean, 1828 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien.
Mong. centr.: Arbaj-Chere; Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 42—52) 30 Ex.
- Agonum gracilipes** Duftschmid, 1812 — Verbreitung: Europa, UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Ussuri-Gebiet, Mongolei, Korea, Tibet.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 7 Ex.
- Laemostenes refleximargo** Reitter, 1894 — Verbreitung: Mongolei.
Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 52) 2 Ex.
Bemerk.: Von den Gattungen *Amara*, *Apristus*, *Elaphrus* und *Harpalus* bleiben noch 9 Exemplare unbestimmt.