

(Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, 13: 21—22)

Ergebnisse der mongolisch-tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei

Nr. 15: Coleoptera — Cantharidae und Malachiidae*)

WALTER WITTMER
(Herrliberg — Zürich)

Cantharidae

- Podabrus flavimanus** MOTSCH. Bogdo-ul, 11. 8. 1966 (loc. 39).
Rhagonycha geniculata GEBL. Nucht, 23.—24. 7. 1965 (loc. 34); Zaisan,
9. 8. 1966 (loc. 38).
Rhagonycha kiritschenkoi BAROV. Bogdo-ul, 11. 8. 1966 (loc. 39); Baga
Tenger, 22. 7. 1965 (loc. 2); Bulgan, 5. 8. 1965 (loc. 15—16).
Malthodes guttifer KIES. Bulgan, 7. 8. 1965 — 2 ♀ (loc. 18).

Malachiidae

- Ebaeus formaneki** REITT. Ulan Bator, 25. 7. 1965 (loc. 5).
Ebaeus patricius AB. Songino, 28.—29. 7. 1965 — 1 ♀ (loc. 8—9).
Troglocollops obscuricornis (MOTSCH.) Nucht, 23.—24. 7. 1965 (loc. 34).
Troglocollops cinctus (GEBL.). Bogd, 23. 8. 1966; Arbaj-Chere, 15.—16. 8.
1966 (loc. 42) in Anzahl erbeutet.
Troglocollops mongolicus ssp. **dlabolai** nov. Chubsugul, 17. & 18. 8. 1965,
(loc. 28 & 29), ein Pärchen.
T. mongolicus WITTM. wurde nach 1 ♂ vom Karakorum (Mongolei)
beschrieben, und im ersten Augenblick glaubte ich, wir hätten es bei den
beiden von Herrn Dr. Dlabola erbeuteten Exemplaren mit einer weiteren
Art dieser Gattung zu tun. Tatsächlich ist die Interokularaushöhlung sehr
ähnlich, mit dem Unterschied, daß die Furche längs der Augen bei der
Rasse tiefer ist und die Stirn seitlich über jedem Auge über der erwähnten
Furche etwas stärker vorsteht als bei *mongolicus*. Der seitliche Vorsprung
der Stirn ist bei der Rasse breit gelb gefärbt, bei der Stammform ist nur
die äußerste Spitze gelb. Große Unterschiede zeigt auch die Form des 1.
Fühlergliedes, welches bei der Rasse, von vorn gesehen, stark nach

*) 39. Beitr. zur Kenntnis der pal. Cantharidae und Malachiidae.

- Unter den ostasiatischen *Haploharpalus*-Arten leicht kenntlich, denn es ist die erste Art, welche die Hinterecken deutlich abgerundet hat, denn die übrigen Arten haben die Hinterecken scharf. Von Dr. Jiří Dlabola gesammelt und zu seiner Ehre benannt.
- Poecilus gebleri** Dejean, 1828 — Verbreitung: UdSSR, Zabaikal, Transbaikal, Nikolsk, Ussurijsk, Mongolei, China, Peking, Mandschurei, Tibet, Szetschuan.
Mong. bor.: Zaisan, Bogdo-Ul; Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 38, 39, 40) 5 Ex.
- Poecilus fortipes** Chaudoir, 1850 — Verbreitung: UdSSR, Irkutsk, Transbaikal, Amur, Ostsibirien, Mongolei, Corea, Japan, Tibet.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 1 Ex.
- Corsyra fuscata** Fischer—Waldheim, 1822 — Verbreitung: UdSSR, Ost-Rußland, Sibirien, Transbaikal, Turkestan, Mongolei, Gansu, N-China.
Mong. centr.: Mandalgobi, Arbaĵ-Chere; Mong. mer.: Baga-Bogdo, Cogt-Ovo (Lok. Nr. 42, 45, 53) 44 Ex.
- Pterostichus rugosus** Gebler, 1823 — Verbreitung: UdSSR, Jenisej, Transbaikal.
Mong. bor.: Zaisan (Lok. Nr. 38) 2 Ex.
- Pterostichus rarus** Lutschnik, 1922 — Verbreitung: UdSSR, Transbaikal Mongolei.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere; Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 40, 41, 42, 52) 29 Ex.
- Pterostichus parens** Tschitscherin, 1897? — Verbreitung: Amur, UdSSR Neu für die Mongolei.
Mong. bor.: Zaisan (Lok. Nr. 38) 1 Ex.
- Amara fodinae** Mannerheim, 1825 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Jenisej, Amur, Ostasien, Mandschukuo.
Mong. bor.: Zaisan; Mong. mer.: Baga-Bogdo, Gurban-Sajchan (Lok. Nr. 38, 45, 46, 50) 8 Ex.
- Amara amurensis** Lutschnik, 1935 — Verbreitung: UdSSR, Amur-Gebiet.
Mong. mer.: Baga-Bogdo (Lok. Nr. 46) 1 Ex.
- Amara laevis** Sahlberg, 1880 — Verbreitung: UdSSR, N. W-Sibirien, Jenisej, Irkutsk, Transbaikal.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 41) 2 Ex.
- Amara mongolica** Motschulsky, 1844? — Verbreitung: Mongolei.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere (Lok. Nr. 42) 1 Ex.
- Taphoxenus pfefferi** Jedlička, 1964 — Verbreitung: Kalgan.
Mong. mer.: Barun-Bajan-Ulan (Lok. Nr. 43) 1 Ex.
- Taphoxenus laticollis** Dejean, 1828 — Verbreitung: UdSSR, Sibirien.
Mong. centr.: Arbaĵ-Chere; Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 42—52) 30 Ex.
- Agonum gracilipes** Duftschmid, 1812 — Verbreitung: Europa, UdSSR, Sibirien, Transbaikal, Ussuri-Gebiet, Mongolei, Korea, Tibet.
Mong. bor.: Bogdo-Ul (Lok. Nr. 39) 7 Ex.
- Laemostenes refleximargo** Reitter, 1894 — Verbreitung: Mongolei.
Mong. mer.: Cogt-Ovo (Lok. Nr. 52) 2 Ex.
Bemerk.: Von den Gattungen *Amara*, *Apristus*, *Elaphrus* und *Harpalus* bleiben noch 9 Exemplare unbestimmt.