

Maurice Pic, Dijon:

65.

COLÉOPTÈRES ASIATIQUES NOUVEAUX.

Les Coléoptères d'origine asiatique qui suivent appartiennent au Muséum de Prague et ceux de Tenasserim ont été recueillis par feu Helfer.

1. *Pseudoscaphosoma basipenne* n. sp.

Oblongum, antice et postice attenuatum, nitidum, glabrum, testaceum, pectore pro parte elytrisque late rufis, his ad basim nigro marginatis et apice late testaceis. Thorace parum transverso, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris thorace non latioribus, lateraliter subarcuatis apice late truncatis, fortiter, irregulariter, sat sparse punctatis, stria presuturali profunda, antice divaricata, ad basim non transverse producta. Long. 3 mill. environ. Tenasserim.

Voisin de *P. binhanum* Pic. en diffère par l'absence de fascie postérieure foncée aux élytres, la forme moins traquée et la ponctuation élytrale plus forte.

2. *Scaphosoma Helferi* n. sp.

Oblongum, elytris subovatis, nitidum, glabrum, rufum aut testaceum, membris testaceis, elytris castaneis, in disco luteo maculatis. Capite rufo, antice testaceo; thorace rufo, sat lato, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris brevibus, subovatis, post humeros paulo dilatatis, postice attenuatis, apice truncatis, fere indistincte punctatis, castaneis, in disco late luteo notatis et apice minute testaceo marginatis, stria presuturali ad basim non prolongata; intra corpore testaceo, pectore pro parte rufescente. Long. 1,5 mill. environ. Tenasserim.

Voisin de *S. niasense* Pic., en diffère par la forme plus courte, les élytres nettement élargis en dessous des épaules, la macule claire élytrale plus postérieure et la bordure apicale étroite. Espèce remarquable entre toutes par la forme de ses élytres.

3. *Toxidium robustum* n. sp.¹⁾

Oblongoelongatum, convexum, nitidum, glabrum, rufum aut pro parte castaneum, membris rufis. Capite parum elongato, minute punctato; thorace sat elongato, antice attenuato minute et sparse punctato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, paulo compressis, postice attenuatis, apice late truncatis, in disco antice pro parte fortiter punctatis, stria presuturali fere oblitérante. Long. 3 mill. environ. Tenasserim.

Espèce voisine de *indicum* Ach. et s'en distinguant par la forme plus robuste et la coloration moins foncée.

4. *Exocentrum explanatidens* n. sp.

Subelongatus, parum nitidus, griseo pubescens et longe fulvo hirsutus, niger capite thoraceque rufis, pedibus pro parte brunneis. Antennis elongatis,

¹⁾ Un co-type figure dans ma collection.

longe pilosis, articulo 1^o longissimo, 2^o sat breve; thorace minute et dense punctato, postice strangulato, lateraliter dentato (dens inaequalis, postice longe spinosa, antice valde deplanata); scutello albo pubescente; elytris subparallelis, fortiter sat sparse punctatis, ad suturam pro parte albidis et post medium transverse et parum distincte albo fasciatis. Long. 3,5 mill. Indes: Kurseong (P. Newton).

Espèce caractérisée par la large dent thoracique conjointement à sa coloration.

5. *Miocris nigroscutatus* v. *bisbimaculatus* n. var.

Niger, capite pro majore parte, thorace, illo in disco supra nigro bimaculato, et lateraliter infra nigro maculato, elytris rubris, his apice late testaceis. Indes: Kurseong (P. Newton).

Très distinct de la forme type, par l'absence de macule préscutellaire foncée aux élytres, et le prothorax n'ayant que deux macules discales noires.

6. *Coenobius Helfer* n. sp.¹⁾

Subovatus, nitidus, castaneus aut plus minusve rufobrunneus, labro membrisque testaceis. Capite sat fortiter et sparse punctato, oculis parum approximatis; thorace brevis et lato, antice attenuato, ad basim fortiter et transverse punctato, antice et medio sparse diverse et minute punctato, lobo postice triangulari producto; elytris brevibus, ad basim pro parte transverse fortiter punctatis, minute lineato-punctatis, in disco aliquot substriatis, intervallis latis, depressis, lateraliter distincte punctatis; pygidio fortiter ruguloso-punctato. Long. 1.5 mill. Indes: Tenasserim (ex Helfer).

Sans doute voisin de *C. pallipes* Jac. et en différant au moins par la tête assez fortement ponctuée, le prothorax diversement ponctué, la coloration moins foncée.

7. *Coenobius punctatus* n. sp.

Oblongo-subovatus, antice et postice attenuatus, nitidus niger, labro membrisque testaceis, antennis supra apice piceis. Oculis griseis, validis, approximatis; thorace sat fortiter et sat regulariter punctato, parum brevis, antice attenuato, lobo postice subtriangulari pauli prominulo, antice transverse sulcato; elytris sat brevibus, fortiter striato-punctatis, intervallis fere depressis, humeris gibbulosis; pygidio dense ruguloso-punctato. Long. 2 mill. Tenasserim (ex Helfer).

Distinct à première vue, du précédent par les yeux se touchants, le prothorax à ponctuation plus forte et plus régulière, les élytres entièrement striés et fortement ponctués.

1) Figure aussi dans la collection Pic représenté par plusieurs co-types