

Doc. Dr. Jan Obenberger:

144.

**DE NOVIS GENERIS TRACHYS SPECIEBUS ORIENTALIBUS  
(COL. BUPR.).**

**NOVÉ ORIENTÁLNÍ DRUHY RODU TRACHYS (COL. BUPR.).**

V následujícím podávám diagnosy nových a většinou velmi význačných druhů rodu *Trachys* z orientální oblasti, zvláště z Javy, odkud dosud bylo jen málo druhů popsáno. Všechny typy uloženy jsou v Coll. Obenberger v Národním Museu.

**1. *Trachys* (sbg. *Habroloma*) *Sinna* n. sp.**

Long.: 2.7, lat.: 1.7 mm. Hab.: Formosa.

Corporis forma subparallelia, lata, subcuneiformis. Aspectu parum nitido. Colore corporis supra cupreobrunneo, obscuro, satis parum nitido, superficie tota pube brunneolutea dense tecta, in elytris in parte suturali fasciis griseis utrimque tribus superpositis, parum conspicuis notatis. Corpore subtus parum nitido, obscuro. Pubescentia corporis satis longa, subtili, densa. Capite valde brevi, linea anteriore desuper visa bisinuato, angulis oculofrontalibus leviter subcarinatis. Fronte lata, epistomate satis lato; parte interoculari frontis longitudine fere duplo latiori, lateribus versus anticem, in linea recta attenuatis. Antennis nigris. Capite in thoracem profunde immerso. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{3}$  latiori, summum latitudinis in basia summa attingente, margine anteriori profunde simpliciter arcuatim, disco aequaliter convexo, haud impresso, foveis basalibus nullis, lateribus valde, regulariter rotundatis, in tertia parte basali fere subparallelis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{2}{3}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter duplo longioribus, a basi fere versus medium levissime, a medio versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, modice nitidis, margine lateroapicali integro, satis dense, satis minute punctatis, subcoriaceis. Humeris leviter elevatis. Carina humerali elytrali distincta, longa. Apice elytrorum conjunctim et satis late rotundatis. Ornamento elytrorum e fasciis transversalibus supra designatis composito. Hoc ornamento satis vago. Gulari lobo distincto. Processu prosternali lato, trapezoidalii. Corpore subtus parum convexo. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum subacuto. Palpis tarsis que nigris.

**O b s e r v a t i o :** Species daec prope illam *Tr. Baumi* m. locanda est.

**2. *Trachys* (sbg. *Habroloma*) *Tyana* n. sp.**

Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Hab.: Sarawak.

Corporis forma subcuneiformi, satis leviter convexa. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra brunneoaeneo, valde obscuro. Superficie tota pube rosido brunnea, subochracea dense et aequaliter tecto. Thorace medio fascia vaga longitudinali clarius ochracea notato, elytris ornamento ochraceogriseo simili, satis claro designatis. Corpore subtus aeneonigro, nitido. Pubescentia corporis densa, longa, subtili, parum elevata, aequali. Capite lato, subplano, angulis oculofrontalibus subrotundatis. Fronte lata, epistomate valde lato; parte interoculari

frontis longitudine circiter 1½ latiori, lateribus versus anticem recte attenuatis. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter 2⅔ latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori valde profunde, late, simpliciter arcuatim emarginato; disco aequaliter convexo, foveis laterobasali bus nullis, lateribus ab angulis posticis versus anticem fortiter, in arcuulo aequali attenuatis. Thoracis sculptura sub pilositate parum distincta. Angulis posterioribus thoracis acutis, productis. Thorace ochraceopiloso, partibus aliquot testaceis, linea media clariore. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter 1⅓ longioribus, thorace capiteque unitis circiter 2½ longioribus, a basi in linea longa, primo recta, dein arcuata versus apicem satis fortiter attenuatis, summum latitudinis circiter in basi attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali subtilissime, sparse serrulato, disco satis leviter convexo, aequali. Carina humerali elytrali distincta, longa. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum e fascia lata suturali, longitudinali, usque ad ¾ posteriores producta, ibidem angulosa atque oblique versus latera angulata, ibidem leviter flexuosa atque usque ad marginem lateralem producta. Gulari lobo satis magno, distincto. Processu prosternali valde lato, brevi, trapezoidalii. Corpore subtus nitido, metasterno dense fortiter punctato. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum rotundato. Tarsis palpis que nigris.

**O b s e r v a t i o:** Propter ornamentum elytrorum valde distincta.

### 3. *Trachys (sbg. Habroloma) Naranga* n. sp.

Long.: 3.1, lat.: 1.9 mm. Hab.: Sarawak: Mont Poi.

Corporis forma robusta, cuneiformi. Aspectu haud nitido. Colore corporis supra nigro, elytrorum basi paullulo aenoviolascente, superficie tota pube ros cida, nigra et ornamentiis argenteis tenuibus tecta. Corpore subtus nigroaeneo, nitido, metasterno satis sparse, fortiter punctulato. Pubescentia corporis brevi, valde densa, subtili, superficiem aequaliter tegente. Capite valde lato, medio late, subtiliter depresso, angulis oculofrontalibus leviter subangulosus. Fronte valde lata, attenuata; parte interoculari frontis longitudine 1¾ latiori, lateribus versus anticem in linea recta attenuatis. Epistomate latissimo, brevi, ante satis profunde emarginato. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter triplo latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori fortiter, late, simpliciter emarginato, disco aequaliter convexo, foveolis basali bus lateralibus nullis, lateribus a basi versus anticem fortiter, in linea arcuata attenuatis, angulis anticis acutis. Thoracis sculptura sub pilositate parum distincta. Thorace testaceo maculoso, maculis aliquot parvis argenteis intermixtis, spatiis aspectu glabro in fundamento nigropilosis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter 1½ longioribus, thorace capiteque unitis circiter 3¼ longioribus, a basi versus apicem primo recte, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis in basi attingentibus, leviter nitidis, margine lateroapicali integro. Humeris leviter elevatis. Carina humerali elytrali longa, subtili. Apice elytrorum satis late conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum e fasciis tribus argenteis, valde flexuosis, transversis, angustis, maculis copiosis testaceis, partibus numerosis obscuris pube nigra ornatis composito. Carina humerali anguste, lineatim pilis testaceis marginata. Gulari lobo valde distincto. Processu prosternali lato, brevi, late trapezoidalii, nitido. Corpore subtus nitido. Abdomine modice convexo. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum subtundato. Tarsis palpisque nigris.

4. **Trachys (s. str.) Erastria n. sp.**

Long.: 3.5, lat.: 2.3 mm. Hab.: Philippines: Tayabas.

Corporis forma robusta, cuneiformi, elongata. Aspectu parum convexo. Colore corporis supra nigro, superficie tota pube rubrobrunnea, subtili, aequali, brevi, tenui aequaliter et satis dense tecta, in elytris fasciis valde flexuosis argenteis, angustis, interruptis tribus ornata. Corpore subtus nigraeneo, nitido. Pubescentia corporis subtili. Capite valde lato, fere plano, medio lineatim subdepresso, marginibus oculofrontalibus subangulosis. Fronto lata, medio lineatim impressa; parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{2}{3}$  latiori, lateribus versus anticem in linea recta attenuatis. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $3\frac{2}{3}$  latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late, profunde, simpliciter emarginato; disco medio leviter transverse impresso, foveis basalibus nullis, lateribus versus anticem fortiter, arcuatim attenuatis. Thoracis sculptura subtilissima, lateraliter et in parte basali subareoliformi. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis fere triplo longioribus, a basi usque medium recte et leviter, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in basi attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali serrulato, disco convexo, leviter ruguloso, punctato, satis nitido. Carina humerali elytrali nulla. Humeris modice elevatis. Apice elytrorum conjunctim late rotundato. Ornamento elytrorum vago, parum conspicuo, satis indistincto. Gulari lobo valde distincto. Processu prosternali late trapezoidali, planato. Corpore subtus valde nitido. Metasterno fortiter, aequaliter, satis sparse punctato. Abdomine subtiliter griseopiloso. Palpis tarsisque nigris. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum apice subrotundato.

**Observatio:** Species haec quam maxime insignis transitum distinctum inter subgenera *Trachys* s. str. et *Habroloma* efficit. Species haec formam habet enim *Habrolomarum*, etiam gularem lobum distinctissimum et processus prosternalis formam, ut in *Habrolomis* occurrit, sed carina humeralis elytralis, illis *Habrolomis* tam insignis, totaliter hic deest. Itaque *Habroloma* solum subgenus generis magnis *Trachys* atque nullum genus speciale uti auctores nonnulli (praecipue Dom. Théry) crediderint, constituere mihi videtur.

5. **Trachys (s. str.) Earias n. sp.**

Long.: 4, lat.: 2.7 mm. Hab.: Java or.

Corporis forma ovali, convexa, valde robusta. Aspectu parum nitido. Colore corporis supra aeneoviolaceo, nigrescente, superficie tota pilis testaceis, in maculas et fascias agglomeratis, maculis (in capite et thorace) parvis argenteis vel (in elytris) fasciis transversis flexuosis et maculis isolatis, partibus alteris pube nigra tectis ornata. Corpore subtus aeneoviolaceo, nitido, coxis posterioribus externe testaceopilosis. Pubescentia corporis brevi, valde subtili, aequali, tenui, densa. Capite latissimo, medio lineatim impresso, marginibus oculofrontalibus obtusis. Fronto valde lata, roscidopilosa; parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus versus anticem in linea recta attenuatis, vertice maculis duabus albis notatis. Epistomate valde lato, antice profunde emarginato. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $3\frac{3}{4}$  latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori profunde, arcuatim, simpliciter emarginato, disco aequaliter convexo, nullo modo impresso, lateribus versus anticem in linea recta oblique attenuatis. Thoracis

sculptura sub pilositate indistincta. Margine basali angusto prothoracis carinatim subelevato. Thoracis parte maiore testaceopilosa, maculis quattuor rotundis, transverse dispositis nigris, fascia longitudinali media partim argenteopilosa, maculisque duabus discalibus et aliquot anterioribus haud distinctis argenteis. Scutello parvulo. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{4}$  longioribus, a basi in tertiam partem basalem subparallelis, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, parum nitidis, margine lateroapicali haud denticulato, aequaliter convexis, subfoveolatim coriaceis, sed sculptura hac sub pilositate parum solum distincta. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum e fascia lata postmediana rubidotestacea, valde flexuosa, postice fascia simili, sed multo angustiore argentea, flexuosa marginata, fascia transversa nigra mediana flexuosa, parte maiore postbasali testaceopilosa, maculis aliquot albis intermixtis, composita. Gulari lobo indistincto. Processu prosternali lato, postice subdilatato, lateribus leviter arcuatis. Corpore subtus fere glabro. Abdomine modice convexo. Angulis lateroposterioribus coxarum posteriorum rotundatis. Palpis tarsisque laete testaceis.

#### 6. *Trachys (s. str.) Rhexinia* n. sp.

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Java or.

Corporis forma satis elongata, ovali, parum convexa. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra nigro, sine ullo nitore aeneo, capite thoraceque pube aequali subtili luteogrisea tectis, pilis aliquot argenteis intermixtis. Elytris postice fasciis valde flexuosis similibus praecapitalibus ornatis. Corpore subtus nigro, valde nitido, mesosterno dense, satis fortiter punctato. Pubescentia corporis subtili, sparsa. Capite medio satis profunde, late, subangulatim, sulcatim excavato. Oculis desuper paullo visibilibus. Fronte lata, medio impressa; parte interoculari frontis longitudine haud latiori, lateribus versus anticem recte attenuatis, epistomate satis lato, antice profunde emarginato. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $3\frac{1}{3}$  latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori simpliciter, haud profunde, arcuatim emarginata, disco satis convexo, postice leviter transverse subdepresso, lateribus versus anticem fortiter, arcuatim attenuatis. Thoracis sculptura sub pilositate parum distincta. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, a basi usque ad medium leviter, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis fortiter nitidis, margine lateroapicali integro, humeris leviter elevatis. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum conjunctim, satis late rotundatis. Ornamento elytrorum distincto, fasciis ambobus praecapitalibus interne magis lutescentibus, externe argenteis. Gulari lobo nullo. Processu prosternali apice dilatato, satis lato, versus anticem recte attenuato. Abdomine nitido, fere glabro. Tarsis palpisque laete testaceoluteis. Coxarum posteriorum angulo lateroposteriori rotundato.

#### 7. *Trachys (s. str.) hylophila* n. sp.

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Tjilatjap.

Corporis forma oblonga, ovali, postice magis attenuata. Aspectu modice nitido. Colore corporis supra obscure viridiaeneo, superficie toto pube satis densa luteogrisea tecto, in pube hac, in elytris, fasciis similibus, haud densio-

ribus, parum distinctis, valde flexuosis, vagis, argenteis ornatis. Corpore subtus aeneo, valde nitido. Pubescentia corporis aequali, subtili, tenui, haud valde sparsa. Capite magno, lato, medio late excavato, angulo oculofrontali subobtuso, oculis parum visibilibus. parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus versus anticem oblique attenuatis, rectis, epistomate satis lato, antice fortiter emarginato. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $3\frac{1}{2}$  latiori, sumnum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late transverse, arcuatim emarginato, disco modice convexo, fovea laterali nulla, lateribus in parte basali media subparallelis, dein versus apicem late rotundatis. Thoracis sculptura sub pilositate parum visibili. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{3}{5}$ , longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a basi in tertiam partem longitudinis parallelis, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum vago, solum paullo quam altera pilositas elytrorum clariore. Gulari lobo nullo. Processu prosternali lato, apice subdilatato, antice parallelo. Tarsis palpisque testaceis. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum rotundato.

#### 8. *Trachys* (s. str.) *foliivora* n. sp.

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Java: Karang.

Corporis forma elongata, ovali, modice convexa. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra obscure aeneo, satis nitido, superficie tota pube sparsa, subtili argentea satis irregulariter tecta, pube hac in elytris fascias valde vagas transversales efficiente. Corpore subtus satis nitido, obscuriore. Pubescentia corporis satis longa, argentea, subtili, tenui. Capite valde lato, medio late angulatim excavato. Fronte lata, medio impressa; parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{3}$  latiori, lateribus versus anticem in linea recta attenuatis. Epistomate lato, antice profunde emarginato. Thorace longitudine circiter triplo latiori, sumnum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori thoracis valde late arcuatim emarginato, disco satis convexo, angulis anticis valde acutis, foveis lateralibus nullis, lateribus versus anticem recte et satis fortiter attenuatis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $1\frac{3}{5}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $1\frac{3}{5}$  longioribus, a basi usque ad tertiam partem basalem subparallelis, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro. Humeris satis elevatis. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum valde vago. Gulari lobo nullo. Processu prosternali angusto, apice subdilatato, antice subparallelo. Corpore subtus aeneonigro, sericeomicante, coxarum posteriorum angulo lateroposteriori acuto. Palpis tarsisque testaceis.