

196.

Doc. Dr. Jan Obenberger, Praha:

DE NOVIS GENERIS SAMBUS H. DEYR. SPECIEBUS IGNOTIS.**NOVÉ NEZNÁMÉ DRUHY RODU SAMBUS H. DEYR. (COL. BUPR.)**

V této práci podávám devět diagnos nových druhů krasců z rodu *Sambus* H. Deyr. a to osmi z Jávy, jednoho z Afriky. Tento krásný rod drobných, na různých rostlinách v tropech žijících krasců je rozšířen četnými druhy v oblasti orientální a v přilehlých částech oblasti palaearktické, to jest hlavně v Číně a dále několika nečetnými druhy v tropické Africe. Africké druhy, ač přináležejí nesporně témuž rodu, mají trochu odlišný ráz a jsou většinou velkými vzácnostmi. V palaearktické oblasti žije jen něco málo druhů, které zřejmě jsou původu jižního a navazují organicky na indočínské, birmánské a indické druhy. Druhy tyto jsou vesměs velmi úhledné a jich opýření, často bílé nebo šedé, vzácněji dvojbarevné, zlatové, kombinované s bílým a šedým, vytváří na krovkách charakteristické, velmi ozdobné ornamenty. Samečkové vyznačují se zpravidla ozdobnějším odlišným, zpravidla smaragdově zeleným zbarvením čela.

*

1. *Sambus Patroclus* n. sp.

Hab.: Java orientalis. Long.: 3.5, lat.: 1.3 mm.

Satis convexus, elongatus, subparallelus, modice nitidus. Capite thoraceque cupreis, elytris ornamento e pilis aureoluteis composito ornatis, partibus sub pilositate hac aureoaeeneis, illis alteris aspectu glabro, obscurius aeneo-violaceis. Capite valde lato, vertice convexo, lato, desuper viso satis producto, fronte plana, lata, parte frontis interoculari longitudine distincte latiore, parallela, nitidissima, aureoviridi, sparse transverse subtilissime strigosorugosa, sparse pilis griseis tecta. Vertice leviter gibboso, medio supra lineatim superficialiter impresso, antennis brevibus, fortibus, aeneis, compactis, articulis 5—11 transversalibus, brevibus. Vertice desuper viso leviter producto, oculis convexis. Thorace longitudine circiter $2\frac{1}{2}$ latiore, antice valde bisinuatim emarginato, angulis anticis acutis, lobo medio lato; summum latitudinis in medio attingente, lateribus leviter rotundatis et versus anticem et basim attenuatis, basi fortiter bisinuata, angulis posticis obtuse rotundatis, parte media discali lata elevata, ante basim late transverse depresso, lateribus leviter, late depresso declivibus. Parte basali impressa atque thoracis lateribus in spatio lato sparse, sed aequaliter pilis aureoluteis tectis, parte lata media transversa elevata subglabra et aspectu paullo obscuriore, subtiliter, haud dense strigosa. Carina prae humerali arcuata, parum distincta. Scutello subpentagonali, transverso. Elytris latitudine fere $2\frac{1}{2}$ longioribus, latis, antice parallelis, post medium leviter dilatatis, dein versus apicem late, leviter, oblique attenuatis, apice ipso lato, conjunctim rotundato et subtruncato. Sculptura subtili, pilositate aureolutea ornamenta sequentia efficiente: 1. fasciola obliqua angusta utrimque in basi prope scutellum posita. 2. Utrisque fascia lata, recta, obliqua, ab humeris versus suturae medium longitudinis producta, figuram litterae »V« efficiente. 3. fascia lata, leviter undulata, transversa praeapicali. 4. Capite summo fasciatim, transverse piloso; fasciis praeapicali et

apicali in sutura anguste iunctis. Parte omni in illa littera »V« fasciformi inclusa aeneo-aurea, partibus alteris violaceo-aeneis, obscurioribus, solum fundamento fasciarum aureo-aeneo. Corpore subtus pedibusque aureo-cuprescentibus, sparse aequaliter griseopilosis. Margine lateroapicali elytrorum subtilissime denticulato. Illo *S. Drescheri* Obenb. vicinus.

2. *Sambus Aeneas* n. sp.

Hab.: Java: Kediri. Semberbajoen. Long.: 3.2, lat.: 1.1 mm.

Species parva, nitida, satis lata, leviter convexa, subparallela, nigra, pilositate sparsa, brevi, grisea, fere aequali regulariter tecta. Capite valde lato, convexo, fronte transverse rugulosa, sparse pilosa, longitudine fere $1\frac{2}{3}$ latiore, lateribus parallelis. Vertice desuper viso latissimo, satis convexo, nullo modo impresso, oculis paullo prominentibus. Thorace longitudine $2\frac{1}{3}$ latiore, lateribus modice rotundatis, paullo ante medium summum latitudinis attingentibus, margine antice modice bisinuato, lobo medio anteriori lato, paullo producto; thorace postice late transverse depresso, lateribus leviter, late subdeplanatis, parte media lata anteriori elevata, superficie tota fere aequaliter pilosa, pubescentia hac parum conspicua, illae elytrorum simili. Scutello late triangulariter pentagonali, parvo, nigro, laevigato, nitidissimo. Elytris latitudine $2\frac{1}{3}$ longioribus, post medium leviter dilatatis, versus apicem late oblique attenuatis, apice late transverse subtruncato et conjunctim rotundato. Sculptura elytrorum squamoso rugosa, subtili, aequali. Pilositate elytrorum fere aequali brevi, grisea, parum conspicua, macula vel spatio lato ovali transverso, post medium longitudinis elytrorum posito denudato, maculaque parvula rotunda anteapicali simili denudata. Corpore subtus pedibusque nigris, nitidis, griseopilosis, pilositate illae partis superioris simili; parte anteriori elytrorum distinctius transverse rugosa. Carinis praehumeralibus thoracis thoracis distinctis, satis elevatis, arcuatis.

3. *Sambus Achilles* n. sp.

Hab.: Java: Kediri. Gambiran. Long.: 3.2, lat.: 1.3 mm.

Species parva, gratiose, satis lata, parum convexa. Capite thoraceque violaceo-cupreis, fronte in mare viridi, elytrorum parte anteriori ($\frac{3}{1.5}$ anterioribus) obscure griseo-violacea, parte posteriori laete aureo-aenea; capite sparse griseopilosa, fronte lata, parallela, spatio interoculari longitudine $1\frac{1}{4}$ latiore, neido, transverse rugoso, vertice lato, leviter producto et elevato, medio late, haud profunde depresso, oculis convexis. Thorace sparse, variegatim, parum conspicue luteo et albo piloso, carinis praehumeralibus desuper visis parallelis, modice elevatis, arcuatis, lateribus arcuatis, paullo ante medium summum latitudinis attingentibus, disco antice melio late elevato, parte basali late transverse depressa; elytris usque post medium parallelis, haud dilatatis, versus apicem late rotundatis, apice ipso late transverse subtruncatim conjunctim rotundato, superficie aequaliter squamoso subrugosa, parte obscura anteriori pilis griseis parum conspicuis subtilibus subvariegatim tectis, solum in tertia parte anteriori sutura breviter et anguste pilis aureis marginata; parte apicali aurea pilis aureis tecta, in pilositate hac antice fascia undulata angusta, e pilis albis densioribus composita notata, maculaque simili alba praeapicali. Corpore subtus pedibusque cupreis, corpore subtus sparse aequaliter griseo piloso. Antennis aureo-aeneis, articulis 5—11 transversis, dilatatis.

4. *Sambus Troilus* n. sp.

Hab.: Java. Samberbajoen; Kediri Distr. Long.: 2.7, lat.: 0.9 mm.

Species parva, nigra, nitidissima; pilis griseis, parum conspicuis in elytris ornamenta vaga efficientibus. Capite lato, fronte cyanea, vertice medio distincte impresso, latissimo; thorace longitudine plus quam duplo latiore, lateribus leviter subsinuatis attenuatis, angulis posticis obtusangulis; carinis prae humeralibus desuper visis divergentibus, parum elevatis; disco antice late, sed paulo elevato, parte basali late transverse depressa; sculptura thoracis subtili, subevanescente. Scutello parvo, laevi. Pilositate thoracis parum distincta. Elytris valde nitidis, nigerrimis, apice summo perparum aenescente, aequaliter squamoso rugulosis, usque versus medium parallelis, dein versus apicem longe attenuatis, apice satis late conjunctim rotundato; latitudine $2\frac{1}{2}$ longioribus, nitidis. Pilis griseis, subtilibus, satis sparsis, parum conspicuis, ornamenta sequentia formantibus: 1. fasciam obliquam utrimque prope scutellum positam. 2. fasciam mediam valde flexuosam, in partes tres utrimque divisam; 3. fasciam praeapicalem fere rectam, latiore; apice atque maculis vel pilorum agglomerantionibus vagis in parte humerali et anteriori formantibus. Corpore subtus nitido, nigro, pedibus leviter cyanescentibus.

5. *Sambus Castor* n. sp.

Hab.: Java or.: Distr. Kediri. Samberbajen. Long.: 4, lat.: 1.5 mm.

Species satis robusta, modice convexa. Capite cupreo, thorace elytrisque nigris, ornamentis griseopilosis ornatis. Capite magno, vertice lato, leviter convexo, medio lineatim impresso. Fronte plana, spatio interoculari frontis longitudine parum latiore, antennis brevibus, compactis, parum dilatatis, aureovirentibus, oculis satis convexis. Thorace longitudine circiter $2\frac{1}{2}$ latiore, lateribus satis fortiter rotundatis, fere in tertia parte anteriori summum latitudinis attingentibus, angulis posticis late obtuse rotundatis, lateribus versus anticem fortius quam versus basim rotundatim attenuatis, parte media anteriori lata transverse leviter subelevata, lateribus late subdepressis, parte ante-basali late transverse depressa, parte media fere glabra, solum ante scutellum linea vaga pilorum notata, partibus lateralibus satis latis sparse griseo pilosis, pilis his aequaliter dispositis et transverse positis. Scutello transverso, laevigato. Elytris subtiliter et aequaliter transverse squamoso rugosis, satis nitidis, ornamentis pilosis e pilis aequalibus albogriseis, parum densis compositis et uti sequitur, dispositis: 1. basi vage subundulatim pilosomarginata. 2. fascia valde flexuosa antemediana in maculas aliquot utrimque divisa; 3. fascia lata leviter undulata praeapicali; 4. fascia obliqua simili anteapicali, illis ambobus secundum suturam satis late iunctis. Corpore subtus nigroaeneo, pedibus cuprescentibus. Elytris satis robustis, antice fere parallelis, post medium leviter subdilatis, versus apicem satis breviter attenuatis, apicibus separatim rotundatis, margine lateroapicali distincte denticulato.

6. *Sambus Pollux* n. sp.

Hab.: Java or.: Distr. Kediri. Samberbajoen. Long.: 3.1, lat.: 1.2 mm.

Species nigra, nitidissima, superficie tota metallice nitente. Capite magno, satis lato, fronte plana, transverse rugosa, smaragdinea, nitidissima, vertice nigro, purpurascente, medio distincte lineatim impresso. Spatio interoculari frontis longitudine paulo latiore. Antennis brevibus, aureis, compactis, arti-

culis 5—11 valde transversis, dilatatis. Thorace lato, brevi, longitudine fere $2\frac{2}{3}$ latiore, nigro, angulis acutis anterioribus summis smaragdineis, margine angustissimo laterali purpureo cuprascente, superficie indigaceonitente; lateribus valde aequaliter rotundatis, in medio summum latitudinis attingente, disco antice late, sed leviter transverse elevato, parte antebasali late transverse depressa, carinis prae humeralibus distinctis, arcuatis; thorace subtiliter et satis vage sculpto, vage et sparse, versus latera distinctius griseopiloso. Angulis basalibus obtusis. Scutello transverso, laevigato. Elytris latitudine circiter $2\frac{1}{4}$ longioribus, usque post medium parallelis, dein longe rotundatim attenuatis, apice satis late, sed regulariter rotundato, marginibus lateroposterioribus subtilissime denticulatis, superficie aequaliter convexa et sculpta, lateribus usque post medium parallelis, dein haud dilatatis. Superficie elytrorum fortiter indigaceonitente, parte dorsali media anteriori magis viridinitente, apice summo anguste violaceocuprascente, lateribus antice angustissime cupreoviolaceis. Ornamentis elytrorum e pilis argenteis satis longis sed sparsis compositis, agglomerationes satis vagas formantibus, uti sequitur dispositis: 1. maculis aliquot in parte basali; 2. fascia valde undulata transversa in partes aliquot interrupta, in medio posita; 3. fasciis duabus subconjunctis praeapicalibus undulatis, uti unam fasciam, interne subfenestratam formantibus. Praetera, prope suturam, utrimque, maculis similibus, sed e pilis citriniis, luteis compositis, scilicet: 1. prope scutellum, 2. in medio prope suturam (partem internam vel maculam internam fasciae mediae formante). Corpore subtus nigro, pedibus laete cupreoauris.

7. *Sambus Telamon* n. sp.

Hab.: Java: Tjomanoeck. Distr. Kediri. Long.: 3.8, lat.: 1.1 mm.

Illo *Sambo Drescheri* Obenb. e Java simillimus, fere eadem forma, eodem colore et systemate ornamento, sed signis sequentibus aberrans: gracilior, lateribus thoracis, minus rotundatis, fronte maris aurea, non smaragdinea, vertice minus producto, maiore parte ornamentorum elytrorum, prope suturam positorum aureis, parte lata centrali elevata thocis utrimque antice macula lutea notata, pedibus maris nullo modo cuprescentibus, sed laete cupreis. Apice elytrorum late conjunctim truncato.

8. *Sambus Aiax* n. sp.

Hab.: Java. Distr. Kediri. Samberbajoen. Long.: 3.7, lat.: 1.2 mm.

Species parva, satis lata, robusta, nigerrima, in elytris ornamentis vagis e pilis griseis, parum conspicuis compositis ornata. Illo *Sambo Troilo* m. simillimus et ab hac specie uti sequitur, divergens: fronte nigra, paullo latiore, non parallela, sed versus anticem quamquam levissime, tamen distincte attenuata. Vertice latiore, magis producto, haud impresso. Thorace nigerrimo, latiore, lateribus magis regulariter rotundatis, in medio summum latitudinis attingentibus, versus basim multo minus fortiter et arcuatim attenuatis, angulis posticis late obtuse rotundatis. Carina prae humerali oblitterata. Elytris latioribus, brevioribus, magis robustis, densius et rugosius sculptis, ornamentis griseis similibus, sed e pilis paullo densioribus et longioribus compositis, similiter dispositis, sed fasciis praeapicalibus duabus (in illo *Sambo Troilo* m. fascia hac solum una). Elytrorum apice conjunctim rotundato. Superficie tota densius sculpta et multo minus nitida. Corpore subtus pedibusque nigerrimis.

9. *Sambus massaicus* n. sp.

Hab.: Africa or. angl. Long.: 4, lat.: 1.2 mm.

Elongatus, convexus, satis cylindraceus, cupreoaeneus, capite magis aeneascente. Superficie satis nitida,, pilis satis longis griseis, in elytris ornamenta efficientibus, tecta. Parte apicali elytrorum leviter violascente. Capite convexo, oculis haud prominulis, parum convexis, vertice satis lato, medio superficialiter, lineatim impresso. Fronte rugosa, sparse griseopilosa, parallela, spatio frontis interoculari longitudine parum latiore. Thorace longitudine duplo latiore, lateribus rotundatis, in medio summum latitudinis attingente, carinis praehumeralibus convexis arcuatis, desuper visis rectis et parallelis, parte antebasali late transverse depressa, superficie satis fortiter rugosa, inaequaliter pilis in sensu diversos, praecipue transverse, dispositis tecta. Scutello satis parvo. Elytris latitudine $2\frac{3}{4}$ longioribus, antice parallelis, post medium subdilatis, dein versus apicem longe attenuatis apicibus satis anguste separatim rotundatis, sculptura squamoso rugosa, postice subtiliore, antice magis transverserugosa, pilis griseis longis, mollibus et satis parum conspicuis, haud densis, subtilibus, ornamenta satis vaga, uti sequitur, efficientibus: 1. fasciam vagam valde undulatam basalem subinterruptam; 2. fasciam antemedianam flexuosam, ante medium positam, in partes utrimque tres disjunctam; 3. fasciam flexuosam latam in tertia parte posteriori positam; 4. fasciam transversam praeapicalem; 5. apice summo anguste piloso. Corpore subtus pedibusque violaceocupreis, sparse, breviter, aequaliter griseopilosis.
