

313.

Jan Bechyně:

**O NOVÝCH DRUZÍCH A FORMÁCH JIHOAMERICKÝCH
MANDELINÉK.**

**[DE CHRYSOMELIDARUM AMERICAЕ MERIDIONALIS
SPECIEBUS ET FORMIS NOVIS.
(Col. *Phytophaga*, *Chrysomelidae*).**

Některé z popisovaných druhů a forem označil již † JUL. ACHARD ve své sbírce jmény; předčasné úmrtí znemožnilo mu však jejich literární zpracování. Jeho sbírka tvoří jádro generální sbírky mandelinek, uložené v depositářích Zoologického oddělení našeho Národního musea v Praze, kde jsou též uchovány všechny zde popisované formy. Druh *Eugonycha bryanti* dovoluji si pojmenovat po váženém příznivci, p. Dr. G. E. BRYANTOVĚ, členu Entomologického ústavu Britského musea v Londýně a druh *Cryptostetha palméni* po p. Doc. Dr. E. PALMÉNOVÉ, entomologu Zoologického ústavu v Helsinkách.

Clar. JUL. ACHARD species nonnullas uti novas designabat, sed morte eius praecoxi formae haec dictae descriptae esse haud potuerunt. Nomina originalia, ab Dom. J. ACHARD data, hic transfero. Collectio J. ACHARD partem principalem colectionis generalis Musaei Nationalis Pragae fecit, ubi etiam formae omnes hic descriptae (typi et event. paratypi) conservantur. Speciem *Eugonycha bryanti* in honorem Dom. Dr. G. E. BRYANT (Imperial Institute of Entomology, British Museum) atque speciem *Cryptostetha palméni* in honorem Dom. Doc. Dr. ERNST PALMÉN (Institutum Zoologicum Universitatis, Helsinki) denominare volui.

Genus DORYPHORELLA Achard.

***Doryphorella (Histrionella) histrio* OLIV. ab. *obscurior* n. ab.**

Subtus pedibusque nigris, trochanteribus et femoribus (pro parte) brunneo-testaceis. Supra ut in ab. *macularis* ACHARD (Fragm. Ent. 1922, pg. 47) colorata. — Hab. Brasilia: Santa Catharina (Coll. R. KRÁL); Brasilia (coll. NICKERL).

***Doryphorella (Histrionella) daria* n. sp.**

Hab. Brasilia: Joinville (coll. ACHARD, typus).

Long. corp. 14 mm.

Nigro-coerulea, sat nitida, antennis basi, palparum articulo ultimo apice, labro, clypeo antice, callis anteocularibus trochanteribusque rufo-testaceis, pronoti lateribus supra subtusque, limbo elytrorum lateralí et

basali, per scutellum haud interrupto (hunc circumducto) epipleurisque flavis, elytris obscure sanguineo-brunneis, maculis perpaucis viridimetallicis, ante medium congregatis, fasciam transversam hic conformantibus, ornatis.

Capite fortiter, sat sparse punctato, sulcis ocularibus profundis, sulcis reliquis parum distinctis. Labro minuto quam clypeo $4 \times$ breviore (in speciebus aliis huisus subgeneris solum $1,5 - 2 \times$ breviore). Antennarum articulis apicalibus valde elongatis, plus quam $2 \times$ longioribus quam latis.

Pronoto obscure brunneo, plagiis marginis viridimetallicis disco et basi ornato, dense et fortiter punctato, pone medium latissimo, lateribus rotundatis, angulis anterioribus mucronatis, flavescentibus. Scutello laevi, valde convexo, nigro.

Elytris fortiter punctatis, punctis antice in dimidio interno seriatim coordinatis, intervallis leviter convexis, punctis ad latera et postice irregulariter dispositis, apicem versus dilutioribus. Intervallo marginali (fortiter) et basi (leviter) convexis. Epipleurorum dimidio interno infuscato. Subtus vage pilosa, indistincte sculpturata, episternis metasternalibus punctatis. Processu mesosternali pone medium haud dilatato, sat brevi, quam metasterno vix longiore.

Observatio. Speciei Doryphorella histrio OLIV. affinis. Ab omnibus huius subgeneris *Histrionella* speciebus (ACHARD: Fragm. Ent. 1922, pg. 45—48) labro brevissimo elytrisque fortiter punctatis manifeste differt.

Doryphorella (Histrionella) congener STÅL.

Variationum conspectus:

- 1 (6) Processu mesosternali nigro.
- 2 (5) Pedibus totis rufotestaceis.
- 3 (4) Elytris maculis paucis parvis, nigroaeneis, dispersis ornatis f. *typica*.
- 4 (3) Elytris post basin macula magna nigrocoerulea nec non maculis parvis magis numerosis nigrocoeruleis ornatis. — Brasilia (ex coll. DONCKIER, in coll. ACHARD) ab. *saucipennis* n. ab.
- 5 (2) Pedibus rufo-testaceis, genubus nigrocoeruleis. Supra ut in f. *typica* colorata. Corporis dimensiones valde variabiles sunt: long. 12—17 mm. — Brasilia: Sao Paulo (J. MRÁZ lgt.) ab. *gentica* n. ab.
- 6 (1) Processu mesosternali rubro, pedibus nigro-metallicis, femoribus (apice excepto) rufo-testaceis ab. *fuscitarsis* ACHARD.

Specierum sequentium, inter se valde affinium, enumeratonem signorum communium atque conspectum synopticum affero:

Obscure brunneo-metallicae, supra maxime opacae, elytrorum intervallo 9 : 0 (submarginali) atque saepissime fascia basali luteis. Antennarum articulis ultimis valde elongatis, palparum articulo ultimo quam penultimo minore, breviore et angustiore. Pronoti lateribus plus minusve rotundatis, angulis anterioribus mucronatis. Elytris regulariter seriato-punctatis (serie scutellari abbreviata, seriebus 9 discalibus et

serie iuxtamarginali), intervallis 9 : 0 et 10 : 0 (ultimo, marginali) fortiter convexis, sulcis profundis limitatis. Subtus vase pilosa, parum sculpturata, processu mesosternali quam metasterno vix longiore. Tarsorum articulo unguiculifero (3 : 0) subtus inermi.

Observatio. A sectione *D. bivittata* GUÉR., intervallis discalibus haud convexis, a sectione *D. flavovittata* STÅL, intervallis duabus marginalibus convexis et a sectione *D. moneta* STÅL, signo nominato atque vitta submarginali lutea defficiente sectio haec differt.

Specierum synopsis.

- 1 (8) Elytrorum punctorum seriebus punctis foveiformibus magnis immixtis, intervallo 3 : 0 haud flavo.
- 2 (3) Fascia lutea basali elytrorum defficiente *D. flavocincta* GUÉR.
- 3 (2) Elytris basi fascia lutea cum vitta submarginali confluente ornatis.
- 4 (7) Corpore lato, majore, elytrorum intervallis marginalibus valde convexis, fascia lutea basali obliquata, basin ipsam inter scutellum et punctorum seriem sextam haud attingente.
- 5 (6) Pronoto vase tenuiterque punctato, indistincte cordiformi, lateribus fortiter rotundatis, elytrorum punctis foveiformibus paucis. Long. corp. 14—15 mm *D. luteocincta* STÅL.
- 6 (5) Pronoto sparse et fortiter punctato, distincte cordiformi, elytrorum punctis foveiformibus majoribus et densius positis. Capite sparse et sat regulariter aurato-punctato, opaco, callis antennalibus nitidioribus. Labro quam clypeo plus quam duplo breviore, antice subemarginato, subtrapeziformi. Pronoto opaco, lateribus nitidis, sparse et fortiter aurato-punctato, cordiformi, ante medium latissimo, ante angulis posterioribus (rectis) sinuato, angulis anterioribus mucronatis. Scutello quam pronoto paulo nitidiore, laevi. Elytris opacis, pone scutellum et pone suturam antice nitidioribus, serum punctis foveiformibus sparsis, serierum punctis minutis paucis et pro parte confluentibus. Punctorum serie 8 : a (sulciformi prima) e punctis majoribus dense positis composita, serie 9 : a (sulciformi secunda) e punctis minoribus, parum distinctis, composita. Abdomine sparse, sat tenuiter punctato. Processu mesosternali longe conico, sat valido, antrorum regulariter attenuato, quam mesosterno vix longiore. Long. corp. 11—12 mm. — Hab. Brasilia (coll. ACHARD, series typica) *D. egregia* (ACHARD i. l.) n. sp.
7. (4) Corpore minore et angustiore, lateribus subparallelis, haud ventricosis. Elytrorum intervallis marginalibus parum convexis, fascia basali lutea vix obliqua, basi ipsae valde approximata, solum inter scutellum et seriem quartam basi anguste nigricante. Paulo nitidior quam in speciebus praecedentibus. Capite sat dense tenuiterque punctato, labro (toto luteo) semicirculari, apice nullo modo sinuato, quam clypeo vix 2× breviore, antennarum articulo 1 : o (ex toto) et 2 : o (pro parte) brunneo-testaceis. Forma pronoti ut in specie praecedenti, minus distincte cordiformi; pronoti disco dense et fortiter aurato-punctato. Elytrorum punctis foveiformibus densis (praecipue postice), etiam serie 8 : a his punctis foveiformi-

bus instructa, serie 9 : a e punctis magnis composita. Abdomine sparse et tenuiter punctato, processu mesosternali gracili, acuto, regulariter attenuato, quam metasterno haud longiore. Long. corp. 10 mm. — Hab. Brasilia: San Antonio de Barra (coll. ACHARD, typus et paratypus) *D. punctella* (ACHARD i. l.) n. sp.

- 8 (1) Elytris regulariter punctis parvis, aequalibus, seriatim dispositis instructis, punctis foveiformibus defficientibus. Intervallo 3 : o ante medium apicem versus flavo-colorato .. *D. sesquicincta* STÅL.

Doryphorella oberthuri JACOBY subsp. ***montana*** n. subsp.

Subspecies haec a forma nominata corporis dimensionibus minoribus (long. 14 mm), capite sparsius punctato, elytris nitidissimis, tenuiter punctatis nec non coloratione differt. — Hab. Ht. Perú (coll. ACHARD).

- a) Tota obscure violacea, pedibus coerulescentibus f. *typica*.
 b) Obscure coerulea, elytris violaceis ab. *taia* n. ab.

Doryphorella gibbithorax (ACHARD i. l.) n. sp.

Hab. Brasilia: San Antonio de Barra (coll. ACHARD, typus).

Long. corp. 13 mm.

Breviter ovalis, valde convexa, pronoto non solum longitudinaliter sed etiam transversaliter valde convexo. Obscure brunneo-metallica, leviter cupreomicans, praecipue in elytris, palparum articulo ultimo labroque pro parte testaceis.

Capite opaco, tenuiter punctato, punctis fronte vix perspicientibus; sulcis ocularibus rectis, subparallelis, sat fortiter insculptis, sulcis aliis tenuibus, sulcis lateralibus paulo distinctioribus, sulco clypeali (inter callos) fere recto, medio parum angulato. Labro nitidissimo, antice sinuato, quam clypeo (antice bisinuato) paulo breviore, punctis aliquot profundis et magnis instructo. Antennarum articulis apicalibus parum elongatis, clavam parvam formantibus.

Pronoto opaco, valde convexo, ad latera deplanato, antice profunde et late exciso, subcordiformi, ante medium latissimo, disco indistincte ad latera sat fortiter cupreato-punctato, angulis anterioribus mucronatis, angulis posterioribus rectis, prominentibus; lateribus parum rotundatis, ante angulos posteriores sinuatis, nitidissimis. Scutello laevi, subtriangulari, sat nitido, vix longiore quam latioire.

Elytris quam pronoto sensim nitidioribus, dense et fortiter (densius apicem versus) omnino irregulariter foveolato-punctatis, punctis pro parte confluentibus, intervallo marginali leviter convexo, angulis suturalibus sat late rotundatis. Epipleuris haud sculpturatis, sat angustis quam episternis metasternalibus haud latioribus. Subtus nitida, vase punctata, episternis meso- et metasternalibus opacioribus, sparse et fortiter punctatis. Processu mesosternali sat gracili, leviter curvato, antrorsum attenuato, abtuse terminato quam metasterno breviore.

Observatio. Species haec, ad sectionem *D. pastica* GERM. pertinens, corporis dimensionibus gracilioribus, pronoti convexione, punctatione eius elytrorumque ab his discrepat.

Doryphorella acuminata OLIV.

Variationum coloris conspectus:

A) Formae unicolores.

1. Tota obscure cuprea ab. *cupraria* STÅL.
2. Tota viridis ab. *viridana* (ACHARD i. l.) n. ab.
3. Tota viridicuprea ab. *viridicuprea* STÅL.

B) Formae discolores.

4. Viridis, elytris cupreis ab. *cupripennis* n. ab.
5. Viridis, elytris laete purpurascensibus ab. *fulgens* (ACHARD i. l.) n. ab.
6. Coeruleo-viridis, supra viridiaenea f. *typica*.
7. Coeruleoviridis, subtus obscure coerulea, elytris viridicupreis. ab. *smaragdina* (ACHARD i. l.) n. ab.
8. Obscure violacea, elytris viridescentibus ab. *tristis* (ACHARD i. l.) n. ab.

Genus CRYPTOSTETHA Baly.***Cryptostetha liturifera* STÅL.***Cr. liturifera* STÅL, 1858.= *marmorata* BALY 1858.= *infuscata* MOTSCH. 1860.= *imperialis* BALY 1878; WEISE, Junk-Schenkl. Col. Cat. 68, 1916,
pg. 29.

Species tres sequentes inter se valde affines apparent atque characteribus nonnullis communibus enumeratis insignantur:

Elongatae, corporis lateribus subparallelis, obscure metallicaee, macula elongata capitis vertice, antennarum articulis basalibus subtus, palparum articulo ultimo apice, labro apice extremo, pronoti angulis anterioribus ipsis nec non elytris pro magna parte testaceis.

Capite sat opaco, sparse et haud profunde (clypeo densius) punctato. Antennarum articulis apicalibus clavam distinctam formantibus. Pronoto disco paulo nitidiore, ad latera opaciore, hic late sed haud profunde impresso, sparse et fortiter (ad latera praecipue) punctato, pone medium latissimo, lateribus fortiter rotundatis, angulis anterioribus prominentibus. Scutello laevi et nitido. Elytris foveolato-punctatis, punctis inter se plus minusve confluentibus. Subtus nitidissima, laevi (episternis metasternalibus exceptis), nullo modo sculpturata.

Species tres omnes a *Cr. parellina* STÅL, et *Cr. suturalis* BALY, non solum coloratione sed etiam pronoto fortiter punctato discrepant, a *Cr. verecunda* STÅL, pronoti lateribus haud rufotestaceis differunt.

Specierum synopsis.

- 1 (2) Elytrorum epipleuris totis flavescentibus. — Obscure viridiaenea, elytris flavotestaceis, macula elongata communi suturali post scutellum, sutura anguste ad apicem nec non maculis minutis

numerosis praecipue pone medium positis, viridi-aeneis, vittisque longitudinalibus angustissimis singuli elytris septem, sat distinctis, pallide flavescentibus, nervuliformibus. Capite sparse, haud profunde punctato, antennarum articulis apicalibus brunnescentibus. Pronoti punctis foveiformibus sparsis, etiam disco insculptis, angulis posterioribus (brunnescentibus) subobtusis. Elytris nitidis, irregulariter sat sparse foveolato-punctatis, punctis apicem versus densioribus et dilutioribus, punctis pro magna parte (ad latera praecipue) transversaliter confluentibus. Metasterni sulco lateralí antrorsum abbreviato. Long. corp. 11 mm. — Hab. Brasilia: Sao Paulo (J. MRÁZ lgt., typus) ***Cr. palméni*** n. sp.

- 2 (1) Elytrorum epipleuris obscure aeneis, aut ex toto (*Cr. apolena*) aut antice rubro-maculatis. Elytris flavotestaceis, sutura, limbo marginali atque fasciis duabus transversis (ante et pone medium) irregularibus nec non maculis minutis numerosis obscure metallicis. Pronoti solum angulis anterioribus brunnescentibus.
- 3 (4) Supra opaca, solum scutello, elytrorum limbo lateralí atque sutura antice nitidis. Obscure viridi-coerulea, subtus nigro-violacea, elytris ad latera cyaneis. Clypeo dense et fortiter punctato, fronte vix punctata. Pronoto sparse et fortiter punctato-fveolato, angulis anterioribus valde prominentibus, angulis posterioribus valde obtusis. Elytris sat sparse irregulariter punctato-foveolatis, punctis pro magna parte longitudinaliter confluentibus. Metasterni sulco lateralí haud abbreviato. Long. corp. 11 mm. — Hab. Brasilia: Sao Paulo (J. MRÁZ lgt., typus) ***Cr. cassidea*** n. sp.
- 4 (3) Supra opaca, elytris nitidis, ad latera (marginē ipso excepto) opacis. Supra viridi-aenea, subtus coeruleo-violacea. Capite vertice haud punctato, clypeo sparse et sat tenuiter punctato. Pronoto punctis foveiformibus perpaucis instructo, ante angulis posterioribus (fere rectis) sensim sinuato, angulis posterioribus minus prominentibus. Elytrorum dimidio interno antice seriebus punctorum 8 sat regularibus instructo, portionibus reliquis irregulariter punctatis. Punctis inter se rarius confluentibus. Metasterno sulco lateralí profundo, haud abbreviato instructo. Long. corp. 13 mm. — Hab. Brasilia: Sao Paulo (J. MRÁZ lgt., typus) .. ***Cr. apolena*** n. sp.

Cryptostetha 8-notata n. sp.

Hab. Brasilia: Espirito Santo (coll. ACHARD, typus).
Long. corp. 11 mm.

Nigra, vix metallica, opaca, labro, palpis, antennis, pronoti angulis anterioribus, elytri singuli maculis 4: duabus basalibus, una media lunuliformi, ad latera posita et una apicali rotundata nec non epipleurarum portionibus maculis descriptis vicinis, rufotestaceis.

Capite solum pone oculos et vertice punctulato, sulcis omnibus tenuissimis, sulcis ocularibus in foveis parvis oblongis reductis. Palparum articulo ultimo robusto, quam penultimo sensim angustiore. Pronoti lateribus fere rectis, antrorsum leviter convergentibus, angulis anterioribus breviter rotundatis, haud prominentibus, ante angulis posterioribus (obtusis) indistincte sinuatis; disco sparse et haud profunde, ad

latera densius et profundius, punctis magnis instructo. Scutello minus opaco et impunctato. Elytris subregulariter seriato-acervatim punctatis, punctis apicem versus dilutioribus. Subtus sparse et fortiter (episternis metasternalibus praecipue) punctata, metasterni sulco lateralí lateribus approximato, profunde insculpto, haud abbreviato.

Observatio. Species haec speciei *Cr. circumpuncta* STÅL, per statu-ram quam maxime similis, sed coloratione et sculptura ab ea discrepat.

Cryptostetha circumpuncta STÅL.

Species haec in colore et sculptura variat:

- A) Major (8,5—12 mm), elytrorum intervallis haud convexis, supra maxime opaca, tenuissime punctata. — Hab. Montevideo (Uruguay), typus (coll. ACHARD)
..... *Cr. circumpuncta* subsp. *circumpuncta* STÅL.
 1. Supra nigrocoerulea f. *typica*.
 2. Supra violacea ab. *violacea* n. ab.
 3. Supra nigra, indistincte metallice induita ab. *nigricans* n. ab.
- B) Minor (7—10 mm), supra densius et fortius punctata, minus opaca, elytrorum intervallis latioribus, subcostulatim convexis.
— Hab. Argentina: Chaco de Santiago del Estero, Rio Salado (coll. ACHARD, series typica); Haut Paraná, San Ignacio, Misio-nes (coll. ACHARD); Env. de Buenos Aires, 13. 1. 1931
..... *Cr. circumpuncta* subsp. *costipennis* (ACHARD i. l.) n. subsp.
 1. Supra obscure coerulea f. *typica*.
 2. Supra violacea ab. *similis* n. ab.
 3. Supra viridis, pronoto nigro-coeruleo, vel nigro
..... ab. *viridis* (ACHARD i. l.) n. ab.

Genus PROSICELA Er.

Prosicela signifera STÅL ab. **conjuncta** n. ab.

Maculis duabus discalibus anterioribus inter se confluentibus. — Hab. Caracas (coll. ACHARD).

Genus EUGONYCHA Chevrl.

Eugonycha bryanti n. sp.

Hab. Brasilia: Pernambuco (coll. ACHARD, typus).

Long. corp. 8,5 mm.

Nitida, flavotestacea, mandibulis apice, antennis (basi excepta) tarsisque nigris.

Capite antice distincte, sat tenuiter punctato, vertice fere laevi. Sulcis ocularibus parallelis, valde abbreviatis, sulco frontali (medio) parum distincto, sulcis reliquis sat profundis. Antennis brevibus, clavatis, articulis 3 primis subtus flavescentibus, articulis 3 penultimis subtrans-versis. Labro antice recte truncato, quam clypeo 1,5× breviore.

Pronoto fere 3× latiore quam longiore, valde convexo, tenuiter (ad latera fortius), dense punctato, ante basin latissimo, antrorum

rotundatim attenuato, angulis anticis acutis, angulis posticis obtusis. Scutello antice bisinuato, subtriangulari, laevi, haud longiore quam latiore.

Elytris haud longioribus quam latioribus, inaequaliter dense et fortiter punctatis, intervallis punctulatis, intervallo marginali laevi, angulis suturalibus breviter rotundatis et indistincte mucronatis. Subtus nitida, laevi, episternis metasternalibus infuscatis, fortiter punctatis. Mesosterno leviter elevato, brevissimo. Tibiis extus brevissime sulcatis.

Specierum generis *Eugonycha* conspectus:

- 1 (6) Pedibus totis flavis.
- 2 (3) Antennarum articulis ultimis nigris *E. melanostoma* STÅL.
- 3 (2) Antennis totis flavis.
- 4 (5) Major (10—11 mm), labro luteo, pronoti disco tenuiter punctato *E. impicta* STÅL.
- 5 (4) Minor (9 mm), labro toto nigro, pronoti disco dense et fortiter punctato (Fragm. Ent. 1923, pg. 91) *E. tuberculata* ACHARD.
- 6 (1) Tarsis et antennis (his pro magna parte) nigricantibus *E. bryanti* n. sp.

Genus **MICROTHECA** Stål.

Microtheca nitens n. sp.

Hab. Bolivia: Cochabamba (lgt. GERMAIN; ex coll. Mus. DONCKIER, in coll. ACHARD, typus).

Long. corp. 4,2 mm.

Obscure brunneo-metallica, viridi-micans, nitida, antennis, palpis, pedibus segmentoque anali testaceis, femoribus leviter infuscatis.

Capite microscopice reticulato, sat fortiter, haud dense punctato, clypei sulcis lateralibus arcuatis (intus), leviter divergentibus, cum sulcis ocularibus (ab oculis parum distantibus) angulatim confluentibus. Callis antennalibus parum elevatis, vix transversis, pone oculos et antice pilosis. Oculis valde transversis et fortiter convexis. Antennis dimidium corporis attingentibus, articulo primo incrassato, articulis 5—11 quam 2—4 haud abrupte dilatatis, in clavam parvam gradualiter transgradientibus.

Prothorace quam elytrorum basi sensim angustiore, fortiter cordiformi, fere duplo latiore quam longiore, nitido, disco fere laevi, ad latera sparse et fortiter punctato, ambitu ex toto sulco lato, haud profundo (basi magis tenui) marginato. Lateribus ante angulos posteriores (sub-acutos) parum sinuatis, ante medium fortiter ampliatis. Angulis, nec posticis nec anticis, prominentibus. Pronoti lateribus ipsis, in dissectione transversa, acutis. Scutello magno, laevi, semicirculari.

Elytris laevibus, nitidis, post medium apicem versus impunctatis, solum modo antice punctorum seriebus 12, quarum serie scutellari et seriebus 6 discalibus fortiter impressis, seriebus 7—8 obsoletis, seriebus discalibus reliquis atque serie iuxtamarginali ut seriebus internis insculptis. Callo humerali parvo, intus et postice impressionibus (posteriore

majore) parum profundis limitato. Elytrorum sulco at carina suturalibus, tenuibus, solum in dimidio postico productis. Subtus sat nitida, sat dense punctata, prostethio antice utrinque foveolato. Pedibus subtusque valde aureo-pilosa.

Observatio. Species haec a ceteris huius generis pronoti lateribus in dissectione transversa acutissimis nec non punctatione elytrorum differt.

***Microtheca planicollis* n. sp.**

Hab. Argentina: Loreto, Missiones (Dr. ČERNOSVITOV lgt., typus).
Long. corp. 5 mm.

Obscure brunneo-metallica, nitidissima, antennis, palpis segmentoque anali apice, brunnescensibus, haud metallicis.

Capite microscopice reticulato, distinete sparse punctato, clypei sulcis lateralibus profundis, antrorsum divergentibus, cum sulcis ocularibus (ab oculis valde distantibus) confluentibus. Callis antennalibus sat elevatis, valde transversis, antice argenteo-pilosis. Clypeo antice atque labro (hoc longe) pilosis. Antennis dimidium corporis attingentibus, articulo primo fortiter incrassato, articulis 2—4 gracilibus, articulis reliquis sensim robustioribus.

Pronoto quam elytris paulo angustiore, transverso, duplo latiore quam longiore; disco complanato, laevi et nitidissimo, ad latera microscopice reticulato, punctis magnis sparsis hic instructo, antice et postice leviter impresso, ambitu ex toto (basi magis tenuiter) sulco bene impresso marginato, lateribus pone medium fortiter sinuatis, angulis anterioribus valde prominentibus, acutis, angulis posterioribus fere rectis, multo minus prominentibus. Pronoti lateribus ipsis in dissectione transversa obtusatis. Scutello magno, laevi, semicirculari.

Elytris nitidissimis, laevibus punctorum seriebus 12 haud geminatis, regularibus (apice minus regularibus) instructis: serie scutellari abbreviata, seriebus discalibus 10 et serie iuxtamarginali. Punctis serierum ipsis tenuiter insculptis, apice paulo dilutioribus. Callo humerali magno, intus impressione sat profunda limitato. Elytrorum sulco et carina suturalibus tenuibus, solum in dimidio postico productis. Subtus nitida, haud sculpturata, solum prosterno et episternis metasternalibus fortiter punctatis, prostethio antice utrinque fovea magna profunda instructo. Segmento anali subtus biimpresso. Pedibus abdomineque (postice praecipue) vage pilosis.

Observatio. Species haec pronoto disco complanato atque punctatione elytrorum facile a speciebus reliquis, superficie tota metallica insignatis, discrepat.

